

# Carrasqueño de la Sierra



- SINONIMIAS:** 'Carrasqueño'.
- ORIGEN:** España (ES).
- DIFUSIÓN:** Se encuentra difundida en el norte de la provincia de Córdoba, en las comarcas Sierra y Valle de los Pedroches.
- DESTINO:** Aceite.

---

## *Consideraciones agronómicas y comerciales*

Variedad poco rústica pues sufre con los inviernos fríos y la sequía, aunque parece tolerante a la caliza. Su capacidad de enraizamiento por estaquillado semileñoso es elevada. La entrada en producción es media.

Época de floración entre media y tardía y maduración tardía. Productividad media y constante. La elevada fuerza de retención de los frutos dificulta su recolección mecanizada. Tiene doble aptitud aunque su destino principal es para aceite, considerándosele de bajo contenido graso.

Parece ser sensible a tuberculosis y repilo.

# Caracteres morfológicos



## ÁRBOL

VIGOR:	medio
PORTE:	abierto
DENSIDAD DE COPA:	espesa




## INFLORESCENCIA

LONGITUD:	larga
NÚMERO DE FLORES:	medio



## HOJA

FORMA:	elíptico-lanceolada
LONGITUD:	media
ANCHURA:	media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	plana



## FRUTO

PESO:	medio-elevado
FORMA:	ovoidal
SIMETRÍA:	asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	truncada
PEZÓN:	presente o ausente
LENTICELAS:	abundantes y pequeñas



## ENDOCARPO

PESO:	medio
FORMA:	elíptica
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	apuntado
BASE:	apuntada
SUPERFICIE:	lisa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	con mucrón

