

SINONIMIAS: 'Bella di Spagna', 'Gordal', 'Mollar', 'Morcal de Limón', 'Sevillano'.

ORIGEN: España (ES).

Es una variedad de mesa muy difundida internacionalmente. Su cultivo en España se concentra DIFUSIÓN:

en la provincia de Sevilla donde alcanza 30.000 ha. Fuera de España ha tenido mucha difusión

en Estados Unidos (US), donde se cultivan cerca de 4.000 ha.

DESTINO: Mesa.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Variedad vigorosa cuando está injertada, presenta escaso vigor en sus propias raíces. Se considera tolerante al frío invernal y a la humedad pero es susceptible a la seguía.

Su capacidad de enraizamiento por estaquillado semileñoso es muy baja, por lo que normalmente se recurre al injerto para su propagación.

Su entrada en producción es media. Su época de floración es media, se considera autoincompatible, de elevado aborto ovárico y con polen de muy baja germinabilidad.

Su productividad es baja y alternante. La época de maduración de sus frutos es precoz y se destinan exclusivamente para aderezo, pues su contenido en aceite es muy bajo. Como aceituna de mesa es apreciada por el gran tamaño de sus frutos más que por su calidad. La separación de la pulpa del hueso es difícil y su débil textura, sensibilidad al cocido y tendencia al "alambrado" exigen un proceso industrial muy cuidadoso.

La relación pulpa/hueso es alta. Produce dos tipos de frutos: los normales y los "zofairones", que son frutos partenocárpicos que detienen su desarrollo prematuramente y maduran antes.

Es resistente a repilo y susceptible a tuberculosis y aceitunas jabonosas.

Caracteres morfológicos





ÁRBOL

VIGOR: PORTE:

DENSIDAD DE COPA:

medio erguido media



* INFLORESCENCIA

LONGITUD:

Número de flores:

larga alto



HOJA

FORMA:

LONGITUD: ANCHURA:

CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:

elíptico-lanceolada

larga media

plana



FRUTO

PESO:

FORMA:

SIMETRÍA:

POSICIÓN DEL DIÁMETRO

TRANSVERSAL MÁXIMO:

ÁPICE:

BASE:

PEZÓN:

LENTICELAS:

muy elevado ovoidal

ligeramente asimétrico

hacia la base o centrada

redondeado

redondeada

ausente

abundantes y grandes







ENDOCARPO

PESO:

FORMA:

SIMETRÍA:

POSICIÓN DEL DIÁMETRO

TRANSVERSAL MÁXIMO:

ÁPICE:

BASE:

SUPERFICIE:

Número de surcos fibrovasculares:

TERMINACIÓN DEL ÁPICE:

elevado

alargada

ligeramente asimétrico

centrada

apuntado

apuntada

escabrosa

medio

con mucrón



