

Hojiblanca



- SINONIMIAS:** 'Casta de Cabra', 'Casta de Lucena', 'Lucentino'.
- ORIGEN:** España (ES).
- DIFUSIÓN:** Es la tercera variedad española en cuanto a superficie cultivada. Actualmente ocupa más de 200.000 ha en las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada.
- DESTINO:** Doble aptitud.

Consideraciones agronómicas y comerciales


Variedad de fácil enraizamiento. Es resistente a suelos calizos. Se la considera rústica además por su resistencia a la sequía y tolerancia al frío invernal.

Su entrada en producción es media. Su época de floración es de media a tardía y es autocompatible y con polen de mediana calidad.

La maduración es tardía. La productividad es elevada y alternante. Sus frutos presentan elevada resistencia al desprendimiento, lo que dificulta su recolección mecanizada. Tienen doble aptitud y se consideran muy adecuados para el aderezo en negro tipo "californiano" por la textura firme de su pulpa. Su contenido en aceite es bajo pero muy apreciado por su calidad, aunque presenta baja estabilidad. La separación de la pulpa del hueso es difícil.

Se la considera susceptible a repilo, tuberculosis y verticilosis. Tampoco destaca por su resistencia a mosca y lepra.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL

VIGOR:	medio-elevado
PORTE:	erguido
DENSIDAD DE COPA:	media



INFLORESCENCIA

LONGITUD:	corta
NÚMERO DE FLORES:	medio



HOJA

FORMA:	lanceolada
LONGITUD:	larga
ANCHURA:	media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	plana



FRUTO

PESO:	elevado
FORMA:	ovoidal
SIMETRÍA:	simétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	truncada
PEZÓN:	ausente
LENTICELAS:	abundantes y pequeñas



ENDOCARPO

PESO:	elevado
FORMA:	elíptica
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	redondeada
SUPERFICIE:	rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	con mucrón

