

# Lechín de Sevilla



- SINONIMIAS:** 'Ecijano', 'Lechín', 'Lechino', 'Zorzaleño'.  
**ORIGEN:** España (ES).  
**DIFUSIÓN:** Ocupa más de 125.000 ha en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz.  
**DESTINO:** Aceite.

## *Consideraciones agronómicas y comerciales*

Variedad vigorosa, de gran adaptación a terrenos desfavorables y a zonas frías.

Presenta elevada resistencia a suelos calizos, a la salinidad y a la sequía. Debido a esta rusticidad se la considera un excelente patrón de otras variedades. Su aptitud al enraizamiento es elevada.

La entrada en producción es media.

Su época de floración es media. En ocasiones presenta elevados porcentajes de aborto ovárico y tiene un polen de baja capacidad germinativa, pero es considerada, en general, autocompatible.

La productividad es elevada y alternante. La maduración de sus frutos es temprana. Estos presentan una elevada relación entre fuerza de retención del fruto y tamaño, lo que dificulta su recolección mecanizada. Esta variedad se encuentra en regresión por su contenido en aceite medio y su dificultad de recolección. Tiene, sin embargo, un aceite apreciado organolépticamente y también puede aderezarse en negro.

Es susceptible a tuberculosis pero destaca por ser una de las variedades más resistentes al repilo y a la mosca.

# Caracteres morfológicos



## ÁRBOL

VIGOR:	elevado
PORTE:	abierto
DENSIDAD DE COPA:	espesa



## INFLORESCENCIA

LONGITUD:	corta
NÚMERO DE FLORES:	bajo



## HOJA

FORMA:	elíptico-lanceolada
LONGITUD:	media
ANCHURA:	media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	plana



## FRUTO

PESO:	medio
FORMA:	ovoidal
SIMETRÍA:	asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	truncada
PEZÓN:	ausente
LENTICELAS:	abundantes y pequeñas



## ENDOCARPO

PESO:	medio
FORMA:	elíptica
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	apuntado
BASE:	apuntada
SUPERFICIE:	lisa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	con mucrón

