

# Manzanilla Cacereña



- SINONIMIAS:** 'Albareña', 'Alvellanilla', 'Asperilla', 'Blanca Cacereña', 'Cacereña', 'Costalera', 'Hembra', 'Manzanil', 'Manzanilla', 'Morillo', 'Negrilla', 'Perito', 'Redonda', 'Redondilla' y 'Turiel', en España; 'Azeitona', 'Azeitoneira' y 'Negrinha', en Portugal.
- ORIGEN:** España (ES) o Portugal (PT).
- DIFUSIÓN:** Ocupa 64.000 ha en España, en las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca, Ávila y Madrid. También se encuentra difundida en Portugal (PT).
- DESTINO:** Doble aptitud.

## *Consideraciones agronómicas y comerciales*

Variedad poco vigorosa, de buena adaptación a suelos pobres y al frío invernal.

Su capacidad de enraizamiento es muy elevada.


Entrada en producción precoz. Su época de floración es temprana y es considerada autocompatible y de bajo porcentaje de aborto ovárico. De productividad elevada y constante.

La maduración de sus frutos es precoz y presentan baja fuerza de retención, que facilita su recolección mecanizada.

Es muy apreciada para su aderezo, tanto en verde como en negro, por la calidad de su pulpa. Su contenido en aceite es bajo, aunque de calidad. La separación de la pulpa del hueso es fácil.

Es susceptible a verticilosis y tolerante a mosca y tuberculosis.

## Caracteres morfológicos



### ÁRBOL

VIGOR:	bajo
PORTE:	abierto
DENSIDAD DE COPA:	media



### INFLORESCENCIA

LONGITUD:	media
NÚMERO DE FLORES:	medio



### HOJA

FORMA:	elíptico-lanceolada
LONGITUD:	media
ANCHURA:	media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	plana



### FRUTO

PESO:	elevado
FORMA:	esférica
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada o hacia la base
ÁPICE:	redondeado
BASE:	truncada
PEZÓN:	ausente
LENTICELAS:	abundantes y pequeñas



### ENDOCARPO

PESO:	medio
FORMA:	elíptica
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	apuntada
SUPERFICIE:	rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	con mucrón

