

Manzanilla de Sevilla



- SINONIMIAS:** 'Carrasqueña', 'Manzanilla', 'Manzanilla Basta', 'Manzanilla Blanca', 'Manzanilla Común', 'Manzanilla de Carmona', 'Manzanilla de Dos Hermanas', 'Manzanillo', 'Manzanillo Fino', 'Manzanillo Temprano', 'Romerillo', 'Varetuda'.
- ORIGEN:** España (ES).
- DIFUSIÓN:** Es la variedad de olivo más difundida internacionalmente. Su cultivo en España se concentra en las provincias de Sevilla (50.000 ha), Badajoz (30.000 ha) y Huelva (4.000 ha). Fuera de España también se cultiva en Portugal (PT), Estados Unidos (US), Israel (IL), Argentina (AR) y Australia (AU).
- DESTINO:** Mesa.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Variedad de vigor reducido que se adapta fácilmente al cultivo en plantaciones intensivas. Se considera susceptible a la asfixia radical, a la clorosis férrica en suelos calizos y al frío invernal.


Su capacidad de enraizamiento es media, tanto por estaca como por estaquillado semileñoso en nebulización.

Su entrada en producción es precoz. Su época de floración es media y su polen presenta elevada capacidad germinativa. En España se cultiva sin polinizadores. No obstante, se ha observado aumento de cuajado con polinización cruzada y necesidad de polinizadores en otros países.

La productividad es elevada y alternante. Su época de maduración es precoz y presenta elevada resistencia al desprendimiento. En España se recoge en verde para su aderezo por fermentación al estilo "sevillano" y en Estados Unidos se recoge en envero, para su aderezo en negro por oxidación, al estilo "californiano". Es la variedad de mesa más apreciada internacionalmente por su productividad y calidad de fruto. Por otro lado, su contenido en aceite es medio y de elevada calidad y estabilidad. La separación de la pulpa del hueso es fácil.

Se considera muy sensible a verticilosis y sensible a repilo, tuberculosis, lepra y mosca.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL

VIGOR:	bajo-medio
PORTE:	abierto
DENSIDAD DE COPA:	media



INFLORESCENCIA

LONGITUD:	corta
NÚMERO DE FLORES:	bajo



HOJA

FORMA:	elíptica
LONGITUD:	media
ANCHURA:	media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	plana



FRUTO

PESO:	elevado
FORMA:	esférica
SIMETRÍA:	simétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	centrada
ÁPICE:	redondeado
BASE:	truncada
PEZÓN:	ausente
LENTICELAS:	abundantes y pequeñas



ENDOCARPO

PESO:	elevado
FORMA:	ovoidal
SIMETRÍA:	ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	hacia el ápice
ÁPICE:	redondeado
BASE:	apuntada
SUPERFICIE:	rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	con mucrón

